

Treatment

ในผู้ป่วยรายนี้ ได้ให้ยา corticosteroid รับประทานขนาด 1 มก/กก/วัน ร่วมกับหลีกเลี่ยงอาหารที่คาดว่าจะทำให้เกิดการแพ้ได้สูง เช่น ไข่ นมวัว นมถั่วเหลือง ถั่ว และแป้งสาลี หลังจากให้ยาและจำกัดอาหาร พบว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้น Hct และแอลบูมินในเลือดเพิ่มขึ้น ร่วมกับ eosinophil ในเลือดลดลงตามลำดับ และสามารถหยุดยา corticosteroid ได้ภายใน 1 เดือน เมื่อนัดติดตามการรักษา ก็พบว่าเกิดภาวะนี้ขึ้นอีก

Eosinophilic gastritis (EG)

จากการศึกษาเกี่ยวกับ EG ในเด็ก เมื่อปี 2014 มีงาน review ผลทางจุลพยาธิวิทยาตั้งแต่ปี 2005-2011 ในผู้ป่วยที่มี gastric eosinophil infiltration เข้าถึงเกณฑ์ในปริมาณมากกว่า 70 cells/HPF พบมีผู้ป่วยถึง 37 คน โดย

- 14 ใน 37 ราย มีอาการแพ้ต่อ eosinophil ของนมเฉพาะในกระเพาะอาหารเท่านั้น และมีประวัติแพ้อาหารร่วมด้วย
- ร้อยละ 22 มี PHN ร่วมด้วย
- ร้อยละ 43 มี eosinophilic esophagitis และร้อยละ 21 มี eosinophilic enteritis
- ร้อยละ 82 มีการตอบสนองต่อการทำ dietary restriction therapy

เอกสารอ้างอิง

- Kim HM, Morotti RA, Yershov O, Chehade M. Eosinophilic gastritis in children: clinicopathological correlation, disease course, and response to therapy.

Am J Gastroenterol 2014, 109: 1277-85.