

# โรคท่อน้ำดีตีบตัน

ศ.พญ.สุพร ศรีพงษ์ภรณา

## โรคท่อน้ำดีตีบตันคืออะไร

คือโรคที่มีการอุดตันของท่อน้ำดีทั้งภายนอกตับและภายในตับ ซึ่งเกิดจากการอักเสบและเกิดพังผืดจนท่อน้ำดีตีบตันไป ที่เกิดในการกอายุ 1-2 เดือนแรก ทำให้น้ำดีไม่สามารถขับออกจากตับได้ ทำให้การกเกิดตัวเหลืองตาเหลือง หากไม่ได้รับการรักษา จะเกิดตับแข็งและเสียชีวิตในช่วงอายุ 2 ปี

## โรคนี้อาการเป็นอย่างไร

ทารกจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ร่วมกับถ่ายอุจจาระสีซีดและปัสสาวะสีเข้มตั้งแต่ช่วงเดือนแรกโดยไม่มีอาการผดผื่นอื่นร่วมด้วย ทำให้เข้าใจผิดว่าทารกมีอาการตัวเหลืองที่พบบ่อยเป็นปกติในการกอายุ 1-2 เดือนแรก หากไม่ได้รับการรักษา อาการตัวเหลืองจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับตับม้ามโต เมื่อโรคดำเนินไปจนเกิดตับแข็ง ทารกอาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง เช่น อาเจียนเป็นเลือด ท้องมาน เป็นต้น

## การรักษาทำอย่างไร

เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคนี้แล้ว การรักษาคือผ่าตัดโดยนำลำไส้เล็กมาต่อกับตับแทนท่อน้ำดีที่ตีบ เพื่อให้ น้ำดีไหลออกจากตับได้ ซึ่งจะต้องทำการผ่าตัดภายในอายุ 2 เดือนแรกจึงจะได้ผลดี หากการผ่าตัดได้ผลดี อาการตัวเหลืองตาเหลืองจะหายไป หากการผ่าตัดไม่ได้ผลหรือมารับการรักษาช้าไป ทารกจะมีตัวเหลืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเกิดตับแข็ง ซึ่งการรักษาทางเดียวสำหรับผู้ป่วยที่มีตับแข็งรุนแรง คือ การปลูกถ่ายตับ

## สรุป

ทารกที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองร่วมกับอุจจาระซีด คุณพ่อคุณแม่อย่านิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดเจน เนื่องจากโรคท่อน้ำดีตีบตันจำเป็นต้องรีบผ่าตัดแก้ไขภายในช่วงอายุ 2 เดือนแรก มิฉะนั้น จะเกิดตับแข็งและเสียชีวิตหากไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับ

